

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr LUMIGAN RC®

solution ophtalmique de bimatoprost

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser **LUMIGAN RC** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **LUMIGAN RC** sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on LUMIGAN RC?

Les gouttes pour les yeux LUMIGAN RC sont utilisées pour diminuer la pression intraoculaire (pression à l'intérieur de l'œil) qui est élevée chez les patients adultes atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension (haute pression) oculaire. Si cette pression trop élevée n'est pas réduite, votre vision pourrait finir par se détériorer.

Comment LUMIGAN RC agit-il?

LUMIGAN RC est une préparation utilisée pour traiter le glaucome. Il appartient à un groupe de médicaments appelés analogues des prostamides. Votre œil contient un liquide transparent composé principalement d'eau qui nourrit l'intérieur de l'œil. Ce liquide est constamment éliminé et renouvelé. Si l'écoulement du liquide n'est pas assez rapide, la pression à l'intérieur de l'œil augmente. LUMIGAN RC agit en augmentant l'écoulement du liquide, ce qui permet de diminuer la pression à l'intérieur de l'œil.

Quels sont les ingrédients de LUMIGAN RC?

Ingrédient médicamenteux : bimatoprost.

Ingrédients non médicinaux : chlorure de benzalkonium comme agent de conservation, acide citrique monohydraté, eau purifiée, chlorure de sodium et phosphate de sodium dibasique heptahydraté. De l'hydroxyde de sodium et (ou) de l'acide chlorhydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

LUMIGAN RC se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :

Solution ophtalmique à 0,01 % p/v

N'utilisez pas LUMIGAN RC dans les cas suivants :

- vous êtes allergique au bimatoprost, à l'un des autres ingrédients de LUMIGAN RC ou à l'un des composants du contenant (voir la section intitulée **Quels sont les ingrédients de LUMIGAN RC?**).

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser LUMIGAN RC, afin d'aider à éviter les effets secondaires et d'assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment :

- si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments. L'utilisation de LUMIGAN RC avec d'autres médicaments ou produits contre le glaucome peut réduire leur efficacité;
- si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Dans ce cas, vous devez demander conseil à votre professionnel de la santé avant de prendre tout médicament;
- si vous allaitez ou envisagez d'allaiter. Demandez à votre professionnel de la santé comment nourrir votre bébé pendant que vous utilisez LUMIGAN RC;
- si vous avez une infection évolutive de l'œil, une inflammation de l'œil (p. ex. une uvéite) ou toute autre affection de l'œil ou de la paupière;
- si vous présentez un autre trouble de l'œil (blessure ou infection);
- si vous avez une sécheresse des yeux importante;
- si vous devez subir une chirurgie de l'œil;
- si vous avez des problèmes de foie ou de reins.

Autres mises en garde

Modification de la couleur de l'œil et de la paupière

LUMIGAN RC a été associé à une coloration plus foncée de l'iris (modification de la partie colorée de l'œil). Cette modification est susceptible d'être permanente et risque d'être plus visible si vous ne traitez qu'un œil. Une utilisation excessive de LUMIGAN RC (surdose) pourrait entraîner une coloration plus foncée de l'iris. L'emploi de LUMIGAN RC pourrait aussi causer un assombrissement de la paupière qui peut être réversible chez la plupart des patients.

Croissance de poils

Il est possible que des poils poussent dans des régions de la peau fréquemment en contact avec LUMIGAN RC. Il faut éponger tout excès de solution qui coule de l'œil à l'aide d'un papier mouchoir ou de tout autre papier ou tissu absorbant afin de réduire ce risque. Il pourrait aussi y avoir une différence entre les 2 yeux pour ce qui est de la longueur, de l'épaisseur, de la densité, de la couleur, du nombre et du sens de croissance des cils. Lorsque ces différences se manifestent, elles disparaissent habituellement si vous cessez d'utiliser LUMIGAN RC.

Modification de la vision

L'utilisation de LUMIGAN RC pourrait temporairement brouiller votre vision. Abstenez-vous de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines jusqu'à ce que votre vision redevienne claire.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec LUMIGAN RC :

Aucune étude portant sur les interactions médicamenteuses n'a été effectuée avec LUMIGAN RC.

Comment LUMIGAN RC s'administre-t-il?

- N'utilisez pas le flacon si le sceau de sécurité du goulot a été brisé avant sa première utilisation.
- Utilisez toujours LUMIGAN RC en suivant les directives de votre professionnel de la santé.
- LUMIGAN RC contient du chlorure de benzalkonium, un agent de conservation, qui peut modifier la couleur des verres de contact souples. Si vous portez des verres de contact, retirez-les avant d'utiliser LUMIGAN RC. Attendez 15 minutes après l'administration du médicament avant de les remettre.
- Si vous utilisez LUMIGAN RC en même temps que d'autres gouttes pour les yeux, attendez au moins 5 minutes après l'administration de LUMIGAN RC avant d'appliquer l'autre produit.
- Pour aider à prévenir les infections, évitez que l'embout du flacon compte-gouttes ne touche votre œil ou autre chose. Fermez le flacon à l'aide du capuchon dès que vous avez terminé.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser LUMIGAN RC correctement :

- Lavez-vous les mains. Inclinez la tête vers l'arrière et fixez le plafond. (Voir l'illustration 1.)
- Tirez doucement la paupière inférieure pour former une petite poche. (Voir l'illustration 2.)
- Retournez le flacon et pressez-le délicatement pour libérer une goutte dans la petite poche formée par la paupière. Si la goutte tombe à côté de l'œil, recommencez. (Voir l'illustration 3.)
- Relâchez la paupière et fermez l'œil pendant 30 secondes. (Voir l'illustration 4.)



- Répétez les étapes 1 à 4 dans l'autre œil si les 2 yeux doivent être traités.

Dose habituelle

Adultes : Une goutte de LUMIGAN RC dans chaque œil à traiter, 1 fois par jour, le soir.

Surdose

Si vous avez accidentellement appliqué trop de gouttes dans votre œil, reprenez simplement l'administration habituelle 1 fois par jour le lendemain.

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez utilisé une trop grande quantité de LUMIGAN RC, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose omise

Si vous avez omis votre dose de LUMIGAN RC, appliquez 1 seule goutte dès que vous constatez votre omission, puis reprenez l'administration à l'heure habituelle. Il ne faut pas doubler la dose pour compenser celle qui a été omise.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à LUMIGAN RC?

Lorsque vous utilisez LUMIGAN RC, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Comme tout médicament, LUMIGAN RC peut occasionner des effets secondaires. La plupart de ces effets secondaires sont bénins. S'ils persistent ou s'ils vous inquiètent, consultez votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires pourraient comprendre les suivants :

- Assombrissement de la paupière
- Irritation de l'œil, rougeur, démangeaisons
- Croissance excessive des poils
- Modification de la longueur (allongement) ou de la couleur des cils
- Rougeur et (ou) démangeaisons de la paupière
- Apparition de petites fissures à la surface de l'œil
- Creusement du sillon de la paupière (œil d'apparence creuse) et affaissement de la paupière

Certains patients (moins de 2 %) présentent un changement de la couleur de l'iris (pigmentation de l'iris). Il s'agit d'une coloration plus foncée (assombrissement) de l'iris; les yeux deviennent plus bruns. Ceci survient habituellement pendant la première année de traitement. L'assombrissement de la couleur de l'iris augmente généralement tant que LUMIGAN RC est utilisé. On ignore la signification de ce changement à long terme. Consultez votre professionnel de la santé si vous notez un changement de la couleur de votre iris.

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Gardez LUMIGAN RC dans le flacon d'origine, à une température de 2 à 25 °C. Jetez toute solution inutilisée à la fin du traitement.

N'utilisez pas les gouttes après la date de péremption (voir l'inscription « Exp. ») indiquée sur le flacon et la boîte.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur LUMIGAN RC :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html) ou le site Web du fabricant www.abbvie.ca, ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-704-8271.

Le présent feuillet a été rédigé par Corporation AbbVie.

Dernière révision : 9 SEPT 2022

© 2022 AbbVie. Tous droits réservés.

LUMIGAN RC et son identité graphique sont des marques de commerce de Corporation AbbVie.