

Renseignements destinés aux patient·e·s

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr **ACULAR®**

solution ophtalmique de kétorolac trométhamine

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont rédigés pour la personne qui prendra **ACULAR**. Il peut s'agir de vous ou d'une personne dont vous vous occupez. Lisez attentivement ces renseignements. Conservez-les, car vous devrez peut-être les relire.

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont un résumé. Ils ne sont pas complets. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet d'**ACULAR**, adressez-vous à un professionnel de la santé.

À quoi sert **ACULAR** :

- **ACULAR** est utilisé pour prévenir et traiter l'inflammation de l'œil après le retrait d'une cataracte. Une cataracte est une opacification (diminution de la transparence) du cristallin, la lentille de l'œil.

Comment fonctionne **ACULAR** :

ACULAR fait partie d'une famille de médicaments appelés « anti-inflammatoires non stéroïdiens » (AINS). Ces médicaments diminuent le taux de certaines substances (appelées « prostaglandines »). Lorsque le taux de prostaglandines diminue, l'inflammation diminue aussi.

Les ingrédients d'**ACULAR** sont :

Ingrédient médicinal : kétorolac trométhamine

Ingrédients non médicinaux :

chlorure de benzalkonium à 0,01 % p/v comme agent de conservation, EDTA de disodium, octoxynol-40, eau purifiée, chlorure de sodium et solution d'hydroxyde de sodium et (ou) d'acide chlorhydrique pour ajuster le pH à 7,4.

ACULAR se présente sous la forme pharmaceutique suivante :

solution ophtalmique à 0,5 % p/v

N'utilisez pas **ACULAR** dans les cas suivants :

- vous êtes allergique au kétorolac trométhamine ou à n'importe quel autre ingrédient (voir la section « **Les ingrédients d'**ACULAR** sont :** » ci-dessus).

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser ACULAR, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment :

- si vous êtes allergique à l'acide acétylsalicylique (p. ex. Aspirin®) ou à tout autre antiinflammatoire non stéroïdien;
- si vous avez déjà souffert d'asthme;
- si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. L'administration d'ACULAR n'est pas recommandée pendant la grossesse;
- si vous allaitez ou prévoyez le faire. L'administration d'ACULAR n'est pas recommandée chez les femmes qui allaitent;
- si vous avez subi récemment une intervention chirurgicale à l'œil ou prévoyez en subir une;
- si vous présentez un trouble médical comme le diabète sucré, le syndrome de l'œil sec, la polyarthrite rhumatoïde ou un problème touchant la cornée (la partie avant de l'œil);
- si vous avez des problèmes de saignement. ACULAR peut causer un saignement des yeux lorsqu'il est associé à une intervention chirurgicale à l'œil.

Autres mises en garde :

ACULAR peut causer une vision floue. Vous ne devez ni conduire un véhicule ni utiliser de la machinerie lourde jusqu'à ce que votre vision redevienne normale.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine parallèle.

Les produits suivants pourraient interagir avec ACULAR :

- antiinflammatoires non stéroïdiens comme l'aspirine.

Comment utiliser ACULAR :

- Les verres de contact doivent être retirés avant l'instillation d'ACULAR. Il faut attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.
- ACULAR contient du chlorure de benzalkonium qui peut modifier la couleur des verres de contact souples.
- Utilisez toujours ACULAR en suivant à la lettre les directives de votre médecin.
- Si vous utilisez ACULAR en même temps que d'autres gouttes pour les yeux, attendez au moins 5 minutes après l'administration d'ACULAR avant d'appliquer l'autre produit.
- Pour aider à prévenir les infections, évitez que l'embout du flacon compte-gouttes ne touche votre œil ou autre chose. Fermez le flacon à l'aide du capuchon dès que vous avez terminé.
- ACULAR doit être appliqué uniquement dans l'œil.
- Vous ne devez pas utiliser le flacon si le sceau de sécurité du goulot a été brisé avant sa première utilisation.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser ACULAR correctement.

- Lavez-vous les mains. Inclinez la tête vers l'arrière et fixez le plafond. (Voir l'illustration 1.)
- Tirez doucement la paupière inférieure pour former une petite poche. (Voir l'illustration 2.)
- Retournez le flacon et pressez-le délicatement pour libérer une goutte dans la petite poche formée par la paupière. Si la goutte tombe à côté de l'œil, recommencez. (Voir l'illustration 3.)
- Relâchez la paupière et fermez l'œil pendant 30 secondes. (Voir l'illustration 4.)



Répétez les étapes 1 à 4 dans l'autre œil si les 2 yeux doivent être traités.

Dose habituelle :

Appliquez 1 ou 2 gouttes dans chaque œil à traiter 3 ou 4 fois par jour ou selon les directives du médecin.

Surdose :

En cas d'ingestion accidentelle, buvez beaucoup de liquide.

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop d'ACULAR, contactez immédiatement votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital, votre centre antipoison régional ou le numéro sans frais de Santé Canada, 1-844 POISON-X (1-844-764-7669), même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez une dose de ce médicament, administrez-la dès que vous vous rendez compte de votre oubli. Toutefois, s'il est presque temps de prendre la dose suivante, sautez la dose oubliée et prenez la dose suivante de votre médicament à l'heure prévue. Reprenez l'administration à l'heure habituelle. Il ne faut pas doubler la dose.

Effets secondaires possibles de l'utilisation d'ACULAR :

Voici certains des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez ACULAR. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Effets secondaires fréquents d'ACULAR :

- Irritation de l'œil (sensations de picotement ou de brûlure, rougeur)
- Démangeaisons à l'œil et (ou) enflure de l'œil
- Vision trouble après l'application des gouttes pour les yeux

- Douleur à l'œil
- Conjonctivite

Effets secondaires graves et mesures à prendre à leur égard

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Rare			
Retard dans la cicatrisation des plaies chez les personnes atteintes d'un trouble grave aux yeux comme un amincissement, une érosion, une perforation ou une ulcération de la cornée, aggravation de ces troubles et impact possible sur la vue		✓	
Bronchospasme (difficulté à respirer) et aggravation des symptômes de l'asthme		✓	

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables ([Canada.ca/medicament-instrument-declaration](https://canada.ca/medicament-instrument-declaration)) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- En téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

Remarque : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation :

ACULAR doit être conservé dans son contenant original à température ambiante (15 à 30 °C) et à l'abri de la lumière. Jetez la solution inutilisée 28 jours après l'ouverture.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur ACULAR :

- Parlez-en avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patient·e·s. Ce document se trouve sur le site Web de Santé Canada ([Base de données sur les produits pharmaceutiques : Accéder à la base de données](#)) et sur le site Web du fabricant (www.abbvie.ca) ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-704-8271.

Le présent feuillet a été rédigé par Corporation AbbVie.

Date d'approbation : 2026-09-11