

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

PrACULAR® et PrACULAR LS®

solution ophtalmique de kétorolac trométhamine

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre **ACULAR** ou **ACULAR LS** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **ACULAR** ou **ACULAR LS** sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on ACULAR ou ACULAR LS?

- ACULAR est utilisé pour prévenir et traiter l'inflammation de l'œil après le retrait d'une cataracte. Une cataracte est une opacification (diminution de la transparence) du cristallin, la lentille de l'œil.
- ACULAR LS est utilisé pour atténuer la douleur oculaire et d'autres symptômes qui peuvent apparaître après une chirurgie de correction de la vue. Ces gouttes peuvent atténuer la douleur oculaire, les sensations de brûlure et de picotement, la sensibilité à la lumière et la sensation d'avoir quelque chose dans l'œil.

Comment ACULAR ou ACULAR LS agissent-ils?

ACULAR et ACULAR LS font partie d'une famille de médicaments appelés « anti-inflammatoires non stéroïdiens » (AINS). Ces médicaments diminuent le taux de certaines substances (appelées « prostaglandines »). Lorsque le taux de prostaglandines diminue, l'intensité de la douleur et l'inflammation diminuent aussi.

Quels sont les ingrédients d'ACULAR et d'ACULAR LS?

Ingrédient médicamenteux : Kétorolac trométhamine

Ingrédients non médicamenteux :

ACULAR : chlorure de benzalkonium à 0,01 % p/v comme agent de conservation, EDTA de disodium, octoxynol-40, eau purifiée, chlorure de sodium et solution d'hydroxyde de sodium et (ou) d'acide chlorhydrique pour ajuster le pH à 7,4.

ACULAR LS : chlorure de benzalkonium à 0,006 % p/v comme agent de conservation, EDTA de disodium, octoxynol-40, eau purifiée, chlorure de sodium et hydroxyde de sodium et (ou) acide chlorhydrique pour ajuster le pH à 7,4.

ACULAR et ACULAR LS se présentent sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :

ACULAR : solution ophtalmique à 0,5 % p/v

ACULAR LS : solution ophtalmique à 0,4 % p/v

N'utilisez pas ACULAR ni ACULAR LS dans les cas suivants :

- vous êtes allergique au kétorolac trométhamine ou à n'importe quel autre ingrédient (voir la section intitulée « **Quels sont les ingrédients d'ACULAR et d'ACULAR LS?** », ci-dessus).

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ACULAR ou ACULAR LS, afin d'aider à éviter les effets secondaires et d'assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment :

- vous êtes allergique à l'acide acétylsalicylique (p. ex., Aspirin®) ou à tout autre anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS);
- vous avez déjà souffert d'asthme;
- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. L'administration d'ACULAR ou d'ACULAR LS n'est pas recommandée pendant la grossesse;
- vous allaitez ou prévoyez le faire. L'administration d'ACULAR ou d'ACULAR LS n'est pas recommandée chez les femmes qui allaitent;
- vous avez subi récemment une intervention chirurgicale à l'œil ou planifiez en subir une;
- vous présentez un trouble médical comme le diabète, la sécheresse oculaire, la polyarthrite rhumatoïde ou un problème touchant votre cornée (la partie avant de votre œil);
- vous avez des problèmes de saignement. ACULAR peut causer un saignement des yeux lorsqu'il est associé à une intervention chirurgicale à l'œil.

Autres mises en garde

ACULAR et ACULAR LS peuvent causer une vision floue. Ne conduisez pas un véhicule ou ne faites pas fonctionner de machine lourde jusqu'à ce que votre vision redevienne normale.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec ACULAR ou ACULAR LS :

- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine.

Comment ACULAR et ACULAR LS s'administrent-ils :

- Les lentilles de contact doivent être retirées avant l'instillation d'ACULAR ou d'ACULAR LS. Il faut attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.
- ACULAR et ACULAR LS contiennent tous deux du chlorure de benzalkonium qui peut teinter les lentilles de contact souples.
- Utilisez toujours ACULAR ou ACULAR LS en suivant à la lettre les directives de votre médecin.
- Si vous utilisez ACULAR ou ACULAR LS avec d'autres gouttes oculaires, laissez passer au moins cinq minutes entre l'application d'ACULAR ou d'ACULAR LS et l'application des autres gouttes.
- Pour aider à prévenir les infections, évitez que l'extrémité du compte-gouttes ne touche votre œil ou autre chose. Remettez le capuchon et fermez le flacon dès que vous avez terminé.
- ACULAR et ACULAR LS doivent être appliqués uniquement dans l'œil.
- Vous ne devez pas utiliser le flacon si le sceau de sécurité du goulot a été brisé avant que vous ne l'utilisiez pour la première fois.

Suivez ces étapes pour bien utiliser ACULAR ou ACULAR LS.

- Lavez-vous les mains. Inclinez la tête vers l'arrière et fixez le plafond. (Voir l'illustration 1.)
- Tirez doucement la paupière inférieure pour former une petite poche. (Voir l'illustration 2.)
- Retournez le flacon et pressez-le doucement pour faire tomber une goutte dans la poche. Si la goutte tombe à côté de l'œil, recommencez. (Voir l'illustration 3.)
- Relâchez la paupière et fermez l'œil pendant 30 secondes. (Voir l'illustration 4.)



Répétez les étapes 1 à 4 dans l'autre œil si les deux yeux doivent être traités.

Dose habituelle

ACULAR : Mettez une ou deux gouttes dans l'œil ou les yeux à traiter trois ou quatre fois par jour ou selon les directives du médecin.

ACULAR LS : Mettez une goutte dans l'œil ou les yeux à traiter quatre fois par jour pendant un maximum de quatre jours.

Surdose

En cas d'ingestion accidentelle, buvez beaucoup de liquide.

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une trop grande quantité d'ACULAR ou d'ACULAR LS, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose omise

Si vous omettez d'appliquer ACULAR ou ACULAR LS au moment prévu, appliquez la dose dès que vous vous rappelez de la prendre, puis reprenez l'administration au rythme habituel. Il ne faut pas doubler la dose pour compenser celle qui a été omise.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à ACULAR ou ACULAR LS?

Lorsque vous prenez ACULAR ou ACULAR LS, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Effets secondaires fréquents d'ACULAR :

- Irritation de l'œil (sensations de picotement, de brûlure, rougeur)
- Démangeaisons à l'œil et (ou) œil enflé
- Vision trouble après l'application des gouttes oculaires
- Douleur oculaire
- Conjonctivite (œil rose)

Effet secondaire fréquent d'ACULAR LS :

- Douleur oculaire

Effet secondaire peu fréquent d'ACULAR LS :

- Mal de tête

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
RARE			
Retardent la cicatrisation des plaies chez les personnes atteintes d'un trouble oculaire grave comme un amincissement, une érosion, une perforation ou une ulcération de la cornée, et aggravent ces troubles et peuvent affecter la vue		✓	
Bronchospasme (difficulté à respirer) et aggravation des symptômes de l'asthme		✓	

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire inconfortable qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

ACULAR et ACULAR LS doivent être conservés dans leur contenant original à température ambiante (15 – 30 °C) et à l'abri de la lumière. Jetez la solution inutilisée 28 jours après l'ouverture.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur ACULAR ou ACULAR LS :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), ou le site Web du fabricant (www.abbvie.ca), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-704-8271.

Le présent feuillet a été rédigé par Corporation AbbVie.

Dernière révision le 8 novembre 2022

© 2022 AbbVie. Tous droits réservés.

ACULAR et son identité graphique sont des marques de commerce d'Allergan, Inc., une société d'AbbVie, utilisées sous licence par Corporation AbbVie.

ACULAR LS et son identité graphique sont des marques de commerce d'Allergan, Inc., une société d'AbbVie, utilisées sous licence par Corporation AbbVie.