

Renseignements destinés aux patient·e·s

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr BOEY®

TréribotulinumtoxinE pour injection

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont rédigés pour la personne qui prendra **Boey**. Il peut s'agir de vous ou d'une personne dont vous vous occupez. Lisez attentivement ces renseignements. Conservez-les, car vous devrez peut-être les relire.

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont un résumé. Ils ne sont pas complets. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de **Boey**, adressez-vous à un professionnel de la santé.

Encadré sur les « mises en garde et précautions importantes »

- **Propagation des effets de la toxine :** Les effets de la toxine botulinique pourraient toucher d'autres parties du corps au-delà du point d'injection et causer des symptômes d'une affection grave appelée botulisme. La difficulté à respirer et la difficulté à avaler peuvent mettre la vie en danger.
- Une unité (quantité) de Boey N'EST PAS équivalente à une unité d'autres produits à base de toxine botulinique.
- Boey doit être administré uniquement par un professionnel de la santé ayant reçu la formation adéquate et expérimenté dans l'utilisation de ce produit.
- Respecter la dose et le calendrier d'injection recommandés par votre professionnel de la santé.

À quoi sert Boey :

Boey est utilisé chez l'adulte pour atténuer temporairement l'apparence des rides modérément à fortement prononcées entre les sourcils (appelées sillons intersourciliers, rides de la glabelle ou rides du lion).

Comment fonctionne Boey :

Boey est injecté dans les muscles entre les sourcils. Il agit en bloquant la transmission des signaux qui indiquent aux muscles de bouger, ce qui peut atténuer l'apparence des rides ou des sillons là où Boey est injecté.

Boey commence à agir rapidement une fois qu'il est injecté. Son effet est de courte durée.

Les ingrédients de Boey sont :

Ingrédients médicinaux : tréribotulinumtoxinE

Ingrédients non médicinaux : L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, L-méthionine, poloxamère 188, chlorure de sodium, tréhalose dihydraté

Boey se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :

Poudre pour solution pour injection offerte en flacon à usage unique; 1 400 unités/flacon

N'utilisez pas Boey dans les cas suivants :

- vous êtes allergique à la toxine botulinique ou à l'un des ingrédients de la préparation (énumérés dans la section « Les ingrédients de Boey sont : »);
- vous avez une infection de la peau à l'endroit où vous prévoyez recevoir l'injection.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser Boey, d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment :

- si vous êtes allergique à un produit à base de toxine botulinique;
- si vous avez eu un effet secondaire à la suite de l'utilisation d'un produit à base de toxine botulinique par le passé;
- si vous avez eu une intervention chirurgicale au visage ou une blessure au visage;
- si vous prévoyez subir bientôt une intervention chirurgicale au visage;
- si vous présentez une rougeur ou une enflure (inflammation) à l'endroit où vous prévoyez recevoir une injection;
- si vos muscles sont faibles à l'endroit où l'injection sera pratiquée;
- si vous présentez un affaissement d'une ou des 2 paupières (ptosis);
- si vous présentez tout autre changement dans l'apparence normale de votre visage;
- si vous avez certaines maladies touchant le système nerveux (p. ex. sclérose latérale amyotrophique ou neuropathie motrice).

Autres mises en garde :

- **Réactions au point d'injection :** Comme dans le cas de toute injection, des réactions au point d'injection pourraient survenir après l'administration de Boey. Les symptômes au(x) point(s) d'injection peuvent comprendre :
 - douleur/gêne;
 - enflure/inflammation;
 - rougeur;
 - ecchymoses (bleus);
 - saignements;
 - démangeaisons;
 - sensation de chaleur;
 - durcissement à l'endroit où l'aiguille a pénétré la peau.
- **Faiblesse des muscles situés à côté ou à proximité des points d'injection :** comme un affaissement des paupières et une vision double (voir 2 objets alors qu'il n'y en a qu'un).

Conduite d'un véhicule et utilisation de machines : Si vous présentez un affaissement des paupières ou des troubles de la vision après l'administration de Boey, ne conduisez pas un véhicule et n'utilisez pas de machines jusqu'à ce que ces symptômes aient disparu.

Après avoir reçu Boey, parlez à votre professionnel de la santé si vous présentez les effets suivants :

- **Réaction allergique :** Une réaction allergique est une réaction de votre corps à un médicament. Elle peut causer des symptômes tels qu'une urticaire, une éruption cutanée ou une fièvre. Communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé si vous présentez l'un des symptômes ci-dessous, car ils peuvent être des signes d'une réaction allergique sévère :
 - difficulté à respirer, à avaler ou à parler;
 - enflure, y compris enflure du visage ou de la gorge;
 - respiration sifflante;
 - étourdissements ou sensation de tête légère;
 - essoufflement.
- **Propagation des effets de la toxine :** Parfois, les effets de la toxine botulinique peuvent s'étendre de la zone d'injection à d'autres parties du corps. Communiquez sur-le-champ avec votre professionnel de la santé si vous présentez l'un des symptômes ci-dessous :
 - faiblesse musculaire;
 - difficulté à avaler;
 - entrée de nourriture ou de liquide dans les voies respiratoires.
- **Diminution du clignement ou sécheresse** touchant un seul œil ou les 2 yeux.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine parallèle.

Les produits suivants pourraient interagir avec Boey :

- un médicament différent à base de toxine botulinique;
- les relaxants musculaires (médicaments qui réduisent la tension dans les muscles);
- les antibiotiques (médicaments utilisés pour traiter les infections);
- les anticholinergiques (médicaments qui réduisent la force des muscles).

Demandez conseil à votre professionnel de la santé avant de prendre de nouveaux médicaments.

Comment utiliser Boey :

Boey doit être administré uniquement par des professionnels de la santé ayant reçu la formation adéquate et expérimentés dans le traitement de patients.

Boey est injecté directement dans les muscles (par voie intramusculaire) dans 5 points d'injection situés entre les sourcils.

Boey n'est pas recommandé chez les patients de moins de 18 ans.

Dose habituelle :

La dose habituelle est de 700 unités au total. On vous administrera 140 unités de Boey dans chacun des 5 points d'injection.

Votre professionnel de la santé vous dira quand vous pourrez recevoir un autre traitement par Boey, selon l'apparence de vos sillons intersourciliers.

Surdose :

Communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé si vous constatez des symptômes qui pourraient laisser croire que vous avez reçu une trop grande quantité de Boey. Ces symptômes pourraient se manifester seulement plusieurs jours après l'injection et comprendre les suivants :

- une faiblesse musculaire, qui peut se produire près ou loin du point d'injection;
- de la difficulté à respirer, à avaler ou à parler. Cela pourrait se produire en raison de l'incapacité des muscles à bouger (paralysie musculaire);
- une infection des poumons appelée pneumonie par aspiration, qui peut être causée par l'entrée accidentelle de nourriture ou de liquide dans les poumons en raison de l'incapacité des muscles à bouger (paralysie musculaire);
- un affaissement des paupières;
- une vision double (voir 2 objets alors qu'il n'y en a qu'un);
- une faiblesse générale dans le corps.

Si vous avalez Boey ou s'il vous est injecté accidentellement, consultez votre professionnel de la santé. Il pourrait vouloir vous surveiller de près pendant plusieurs jours.

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez reçu trop de Boey, contactez immédiatement votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital, votre centre antipoison régional ou le numéro sans frais de Santé Canada, 1-844 POISON-X (1-844-764-7669), même en l'absence de symptômes.

Effets secondaires possibles de l'utilisation Boey :

Boey peut causer des effets secondaires, même si ce n'est pas dans tous les cas.

Les effets secondaires peuvent comprendre les suivants :

Peu fréquent : pouvant se manifester chez jusqu'à 1 patient sur 100

- affaissement des paupières;
- affaissement des sourcils;

Rare : pouvant se manifester chez jusqu'à 1 patient sur 1 000

- élévation de la partie externe du sourcil.

Voici certains des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez Boey. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables ([Canada.ca/medicament-instrument-declaration](https://canada.ca/medicament-instrument-declaration)) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- En téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

Remarque : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation :

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Votre professionnel de la santé ne doit pas utiliser ce médicament après la date de péremption.

Le professionnel de la santé gardera ce médicament au réfrigérateur à une température de 2 à 8 °C. Il devrait conserver le flacon dans sa boîte d'origine pour protéger le produit de la lumière.

Une fois que la poudre a été mélangée avec de l'eau salée, le médicament doit être utilisé immédiatement. Il peut être conservé au réfrigérateur à une température de 2 à 8 °C pendant un maximum de 24 heures.

Pour en savoir plus sur Boey :

- Parlez-en avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patient·e·s. Ce document se trouve sur le site Web de Santé Canada ([Base de données sur les produits pharmaceutiques : Accéder à la base de données](#)) et sur le site Web du fabricant (www.abbvie.ca) ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-704-8271.

Le présent feuillet a été rédigé par Corporation AbbVie.

Date d'approbation : 2026-06-30

BOEY et son identité graphique sont des marques de commerce d'Allergan, Inc., une société d'AbbVie.