

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr **QULIPTA**^{MC}

Comprimés d'atogépant

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser **QULIPTA** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **QULIPTA** sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on QULIPTA?

QULIPTA est utilisé pour prévenir la migraine chez les adultes qui ont moins de 15 jours de migraine par mois (c.-à-d. qui sont atteints de migraine épisodique).

Comment QULIPTA agit-il?

QULIPTA appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine (*calcitonin gene-related peptide* ou CGRP). Il agit en bloquant l'action du CGRP, un élément chimique naturellement présent dans l'organisme qui est associé à la migraine.

Quels sont les ingrédients de QULIPTA?

Ingrédient médicamenteux : atogépant

Ingrédients non médicinaux : dioxyde de silicium colloïdal, croscarmellose sodique, mannitol, cellulose microcristalline, copolymère de polyvinylpyrrolidone-acétate de vinyle, chlorure de sodium, stéarylfumarate de sodium et succinate de polyéthylène glycol de vitamine E

QULIPTA se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :

Comprimé d'atogépant à 10 mg, à 30 mg et à 60 mg

N'utilisez pas QULIPTA si :

- vous êtes allergique à l'atogépant ou à tout autre ingrédient de QULIPTA.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser QULIPTA, afin d'assurer la bonne utilisation du médicament et de réduire la possibilité d'effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé des affections dont vous souffrez et de tout autre problème de santé que vous pourriez avoir, notamment :

- si vous avez des problèmes aux reins;

- si vous avez des problèmes au cœur;
- si vous avez des problèmes au foie;
- si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si QULIPTA peut être nocif pour l'enfant à naître;
- si vous allaitez ou prévoyez allaiter. On ne sait pas si QULIPTA passe dans le lait maternel. Consultez votre professionnel de la santé pour savoir quelle est la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant le traitement par QULIPTA;
- si vous avez 65 ans ou plus.

Autres mises en garde

Conduite de véhicules et utilisation de machines : QULIPTA peut causer de la fatigue et de la somnolence. Vous ne devez ni conduire un véhicule, ni utiliser des machines, ni effectuer des tâches qui exigent une attention particulière tant que vous ne connaissez pas bien les effets de QULIPTA sur vous.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous utilisez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Les produits suivants pourraient interagir avec QULIPTA :

- les médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes (p. ex. clarithromycine et rifampine);
- les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques (causées par les champignons) (p. ex. itraconazole et kétoconazole);
- les médicaments utilisés pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (p. ex. éfavirenz et étravirine);
- les médicaments utilisés pour traiter les convulsions et l'épilepsie (p. ex. carbamazépine et phénytoïne);
- la cyclosporine, un médicament utilisé pour bloquer l'action du système immunitaire après une greffe d'organe;
- l'ubrogéant, un médicament utilisé pour traiter la migraine;
- le millepertuis (herbe de Saint-Jean), une plante médicinale fréquemment utilisée pour traiter la dépression et les troubles de l'humeur.

Comment utiliser QULIPTA?

Prenez les comprimés QULIPTA par la bouche exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a indiqué. Il faut prendre QULIPTA 1 fois par jour avec ou sans nourriture.

Ne prenez pas QULIPTA pour traiter une affection pour laquelle il n'a pas été prescrit. Ne donnez pas QULIPTA à d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous. Cela

pourrait nuire à leur santé. Vous pouvez demander à votre professionnel de la santé de vous fournir des renseignements sur QULIPTA.

Dose habituelle

Votre professionnel de la santé déterminera la dose de QULIPTA qui vous convient ainsi que la durée de votre traitement. N'arrêtez pas de prendre QULIPTA sans consulter tout d'abord votre professionnel de la santé.

Surdose

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une trop grande quantité de QULIPTA, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose omise

Si vous omettez une dose de votre médicament, vous pouvez la prendre dès que vous vous rendez compte de votre omission. S'il est presque temps de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose omise et prenez la dose suivante de votre médicament à l'heure prévue. Ne prenez pas 2 doses en même temps pour compenser la dose omise.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à QULIPTA?

Lorsque vous utilisez QULIPTA, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires de QULIPTA pourraient comprendre :

- rhume;
- constipation;
- diminution de l'appétit;
- diminution du poids corporel;
- diarrhée;
- étourdissements;
- somnolence;
- fatigue;
- infection des reins, des uretères, de la vessie ou de l'urètre (infection urinaire);
- infection des sinus et de la gorge (infection des voies respiratoires supérieures);
- inflammation des sinus (sinusite), ou de l'estomac et des intestins (gastroentérite);
- nausées;

- éruption cutanée;
- vomissements.

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada

- en visitant le site Web de déclaration des effets secondaires (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Gardez les comprimés QULIPTA entre 15 et 30 °C.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur QULIPTA :

- Parlez-en à votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), ou le site Web du fabricant (www.abbvie.ca), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-704-8271.

Le présent feuillet a été rédigé par Corporation AbbVie.

Dernière révision : 21 décembre 2022

© 2022 AbbVie. Tous droits réservés.

QULIPTA et son identité graphique sont des marques de commerce d'Allergan Pharmaceuticals International Limited, une société d'AbbVie, utilisées sous licence par Corporation AbbVie.