

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS

comprimés de sucralfate USP / suspension orale de sucralfate

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser **SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS** sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS?

SULCRATE en comprimés est utilisé pour :

- traiter les ulcères duodénaux. Il s'agit de plaies ouvertes qui se forment dans la partie de l'intestin grêle appelée duodénum. Le duodénum est l'endroit où vont les aliments après avoir quitté l'estomac;
- traiter les ulcères d'estomac non cancéreux. Il s'agit de plaies ouvertes qui se forment dans la paroi qui tapisse l'estomac et qui ne sont pas causées par un cancer;
- prévenir le retour des ulcères duodénaux après un traitement antérieur.

SULCRATE SUSPENSION PLUS est utilisé pour :

- traiter les ulcères duodénaux;
- prévenir les saignements dans l'appareil digestif causés par des ulcères de stress chez les patients très malades.

Comment SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS agit-il?

SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS contient du sucralfate, qui agit en formant une barrière protectrice autour de l'ulcère. Le sucralfate forme, dans l'organisme, un gel qui colle à la surface de l'ulcère. Cette barrière protège l'ulcère des acides de l'estomac et l'aide à cicatriser.

Quels sont les ingrédients de SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS?

Ingrédient médicinal : sucralfate

Ingrédients non médicinaux de SULCRATE en comprimés : carboxyméthylcellulose calcique, huile végétale hydrogénée, stéarate de magnésium et cellulose microcristalline

Ingrédients non médicinaux de SULCRATE SUSPENSION PLUS : arôme artificiel de caramel écossais, glycérine, méthylparabène de sodium, phosphate monosodique, propylparabène de sodium et gomme de xanthane

SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :

Comprimé : 1 gramme (g)

Suspension orale : 1 g/5 mL

N'utilisez pas SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS dans les cas suivants :

- vous êtes allergique au sucralfate;
- vous êtes allergique à l'un des ingrédients de SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS, afin d'aider à éviter les effets secondaires et d'assurer la bonne utilisation du médicament.

Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment :

- si vous avez une affection qui entraîne des difficultés à avaler;
- si vous êtes diabétique. Les sucres contenus dans SULCRATE SUSPENSION PLUS pourraient causer une glycémie élevée (un taux élevé de sucre dans le sang) chez les personnes atteintes de diabète;
- si vous présentez une insuffisance rénale chronique ou si vous recevez des traitements de dialyse. Les patients atteints d'insuffisance rénale chronique ou ceux qui reçoivent des traitements de dialyse pourraient ne pas être capables d'éliminer l'aluminium contenu dans SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS, ce qui peut donner lieu à une accumulation d'aluminium dans l'organisme susceptible de causer de la confusion, une faiblesse musculaire, des convulsions et d'autres symptômes;
- si vous êtes enceinte ou essayez de le devenir;
- si vous allaitez ou prévoyez allaiter. On ne sait pas si SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS passe dans le lait maternel.

Autres mises en garde

- SULCRATE SUSPENSION PLUS ne doit pas être administré par voie intraveineuse (administré directement dans une veine, ce qu'on appelle aussi injection intraveineuse). Si SULCRATE SUSPENSION PLUS est injecté dans une veine par erreur, il peut causer des problèmes graves, comme la formation de caillots de sang dans le cœur et le cerveau, ce qui peut provoquer la mort. D'autres problèmes graves ont été observés chez des patients à la suite de l'injection accidentelle de ce produit dans une veine.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS :

- certains médicaments appelés antiacides, qui servent à traiter les brûlures d'estomac et l'indigestion;
- un médicament appelé phénytoïne, qui sert à prévenir les convulsions ou à traiter l'épilepsie;
- un médicament appelé warfarine, qui éclaircit le sang;
- un médicament appelé digoxine, qui sert à traiter des maladies du cœur;

- un médicament antibiotique appelé tétracycline, qui sert à traiter des infections bactériennes;
- certains antibiotiques de la classe des fluoroquinolones, comme la ciprofloxacine et la norfloxacine, qui servent à traiter des infections bactériennes;
- certains médicaments utilisés pour soulager la douleur comme le naproxène, l'indométhacine ou le kétoprofène.

Comment SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS s'administre-t-il?

SULCRATE en comprimés :

- prendre à jeun.
- prendre les comprimés SULCRATE aussi longtemps que votre professionnel de la santé vous l'indique.

SULCRATE SUSPENSION PLUS :

- prendre à jeun.
- prendre par voie orale (par la bouche) ou par sonde nasogastrique pour prévenir les saignements dans le tube digestif.
- prendre SULCRATE SUSPENSION PLUS aussi longtemps que votre professionnel de la santé vous l'indique.

Dose habituelle

SULCRATE en comprimés :

Ulcère duodéal :

- 1 comprimé de 1 g, 4 fois par jour, 1 heure avant chaque repas et au coucher, ou
- 2 comprimés de 1 g, 2 fois par jour, au lever et au coucher

Ulcère d'estomac non cancéreux :

- 1 comprimé de 1 g, 4 fois par jour, 1 heure avant chaque repas et au coucher

Prévention du retour des ulcères duodénaux :

- 1 comprimé de 1 g, 2 fois par jour, au lever et au coucher

SULCRATE SUSPENSION PLUS :

Ulcère duodéal :

- 2 g (2 cuillerées à thé ou 10 mL), 2 fois par jour, au lever et au coucher

Prévention des saignements dans l'appareil digestif :

- 1 g (1 cuillerée à thé ou 5 mL) par la bouche ou par sonde nasogastrique toutes les 4 à 6 heures
- 1 g (1 cuillerée à thé ou 5 mL) administré par un tube mince allant du nez à l'estomac (appelé sonde nasogastrique) toutes les 4 à 6 heures

Surdose

Vous faites une surdose lorsque vous prenez une plus grande quantité de médicament que celle prescrite par votre médecin. Une surdose de SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS pourrait causer de la constipation.

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez utilisé une trop grande quantité de SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose omise

Si vous avez omis de prendre votre médicament, prenez-le dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, attendez et prenez cette dose à l'heure prévue. Ne prenez jamais 2 doses du médicament à la fois.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS?

Lorsque vous utilisez SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

SULCRATE en comprimés :

- Maux de dos
- Constipation
- Diarrhée
- Étourdissements
- Sécheresse de la bouche
- Indigestion (douleur, flatulences, sensation de brûlure ou gêne après avoir mangé)
- Nausées
- Somnolence
- Maux d'estomac
- Vertiges (impression d'avoir le tournis ou que la pièce dans laquelle vous vous trouvez tourne)

SULCRATE SUSPENSION PLUS :

- Constipation
- Diarrhée
- Maux de tête
- Nausées
- Maux d'estomac
- Urticaire

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
RARE			
Réaction allergique : difficulté à respirer, serrement dans la poitrine, sifflement se faisant entendre à la respiration, démangeaisons, éruption cutanée, urticaire, enflure autour du visage, de la bouche, de la gorge, des lèvres ou des yeux			✓
Hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang) : augmentation de la soif, besoin fréquent d'uriner, peau sèche, mal de tête, vision trouble et fatigue. (Cet effet est lié à SULCRATE SUSPENSION PLUS seulement.)		✓	

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommode qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Conservez le médicament à une température comprise entre 15 et 30 °C. Protégez SULCRATE SUSPENSION PLUS du gel.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur SULCRATE / SULCRATE SUSPENSION PLUS :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), ou le site Web du fabricant (www.abbvie.ca), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-704-8271.

Le présent feuillet a été rédigé par Corporation AbbVie.

Dernière révision : 17 juillet 2024

© 2024 AbbVie. Tous droits réservés.

SULCRATE et son identité graphique sont des marques de commerce d'Aptalis Pharma Canada ULC, une société d'AbbVie, utilisées sous licence par Corporation AbbVie.